






Épervier de Cooper

Cooper's Hawk, *Accipiter cooperii*



IDENTIFICATION

De la taille d'une corneille, il a une longue queue légèrement arrondie. Ses ailes sont courtes et arrondies. Sa poitrine est rousse et rayée de blanc et son dos gris bleuté. Il a une tête carrée qui, en vol, dépassent les « poignets » des ailes. Les adultes ont les yeux de couleur rouges et les jeunes de couleur jaunes. La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle.



ÉCOLOGIE

Alimentation

Il se nourrit presque exclusivement d'oiseaux, tels que la tourterelle triste, le geai bleu et l'étourneau sansonnet. Il peut aussi capturer de petits mammifères, des reptiles ou des amphibiens. Il vole habituellement près du sol, sous le couvert végétal, pour chercher une proie.

Reproduction

Le nid est constitué de branches et de brindilles, puis tapissé d'écorce. La couvaison dure 5 semaines, puis les jeunes restent au nid jusqu'au premier vol à 30 jours pour les mâles et 34 jours pour les femelles.

RÉPARTITION

Il habite le sud des forêts et terrains boisés canadiens ainsi que l'ensemble des États-Unis. Il est présent à l'année, grâce à son alimentation variée. Il est aussi possible de l'observer près des mangeoires à oiseaux.

STATUT ET POPULATION

Sa population a connu un déclin dans les années 1970 à cause de l'utilisation de pesticides comme le DDT. L'interdiction de ce dernier au Canada a favorisé la croissance de la population. Sa capacité d'exploitation des paysages modifiés par l'homme l'a notamment aidé. L'espèce est classée en sécurité aujourd'hui.¹

¹ Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015

