





# Nyctale de Tengmalm

Boreal Owl, *Aegolius funereus*



## IDENTIFICATION

Petite chouette nordique, son plumage est brun chocolat tacheté de blanc. Elle a un petit corps trapu, une courte queue et une tête carrée. Le dessus de sa tête brun foncé est parsemé de petits points blancs. Son disque facial bordé de noir et son bec pâle la distingue de la Petite nyctale. Elle n'a pas d'aigrettes sur la tête.



21-28 cm

## ÉCOLOGIE

### Alimentation

Elle se nourrit principalement de petits rongeurs, surtout des campagnols, mais parfois d'insectes et d'oiseaux. Elle est nocturne, mais peut occasionnellement chasser durant la journée. Elle chasse à l'affût. Comme les autres chouettes et hiboux, elle crache une boulette de régurgitation contenant les poils et les os indigestes de ses proies.

### Reproduction

Elle construit son nid à l'intérieur d'une cavité naturelle d'un arbre ou d'un vieux trou de pic. La femelle couve ses œufs durant 4 à 5 semaines. Les jeunes prennent leur premier envol vers l'âge de 5 semaines et sont nourris par les parents durant encore 5 à 6 semaines.

## RÉPARTITION

Cette petite chouette fréquente nos régions du sud du Québec seulement durant l'hiver, lorsque les rongeurs deviennent trop difficiles à trouver dans les régions nordiques. Elle habite les forêts de conifères ou mixtes et la taïga, de préférence en région montagneuse.

## STATUT ET POPULATION

Le Recensement des oiseaux de Noël indique que la population a grandement augmenté au Canada par rapport aux années 1970. Toutefois, ces résultats sont insuffisants pour établir à long terme le statut de la population nationale. Elle peut être vulnérable à la perte de forêts matures. L'espèce est classée en sécurité.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015

