



# Petite buse

Broad-winged Hawk, *Buteo platypterus*




265-560 g



80-100 cm




12-18 ans



2-3

## IDENTIFICATION

Ce rapace est un peu plus petit qu'une corneille. Le mâle et la femelle sont semblables. L'adulte a une poitrine marquée de taches rousses, une gorge blanche et une queue courte foncée traversée par de larges bandes blanches. La petite buse se distingue de la buse à épaulettes par le dessous de ses ailes pâles au contour foncé.



## ÉCOLOGIE

### Alimentation

Elle mange des rongeurs, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et parfois des poissons. Pour repérer ses proies, elle se perche en hauteur et demeure immobile. Ensuite, elle s'élançait sur sa proie en se laissant tomber vers le sol.

### Reproduction

Le couple est fidèle pendant plusieurs années. Le nid est construit dans un grand arbre bien camouflé par le feuillage. La femelle couve ses œufs durant 4 semaines. Les oisillons font leur premier vol vers l'âge de 35 jours. Les jeunes dépendent de leurs parents jusqu'à l'âge de 8 semaines.

## RÉPARTITION

La petite buse recherche surtout les grandes forêts mixtes et les érablières situées près d'un cours d'eau ou d'une clairière. Elle habite les forêts feuillues et mixtes du sud du Canada, de l'Alberta jusqu'aux Maritimes. Elle migre tôt à l'automne vers le sud, jusqu'en Amérique centrale et même jusqu'en Amérique du Sud. On peut parfois observer cette migration dans un regroupement de plusieurs milliers d'individus.

## STATUT ET POPULATION

Les populations sont en augmentation depuis 1970<sup>1</sup>. La fragmentation des forêts dans ses aires de reproduction crée des préoccupations pour la conservation de l'espèce. L'espèce est désignée en sécurité<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Relevé des oiseaux nicheurs du Canada, 2016

<sup>2</sup> Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015