





Chouette rayée

Barred Owl, *Strix varia*



IDENTIFICATION

Son plumage brun et beige entièrement rayé lui a valu son nom. Sa poitrine, son dos et ses ailes sont parsemés de rayures horizontales brunes, alors que les bandes de son ventre sont verticales. Avec l'effraie des clochers, c'est la seule espèce d'oiseau de proie nocturne du Canada dont les yeux sont foncés. Sa grosse tête ronde n'a pas d'aigrettes et ses grands yeux sont bruns foncés, presque noirs.

46-53 cm



ÉCOLOGIE

Alimentation

Elle mange divers petits rongeurs, notamment des campagnols, des tamias, des écureuils et des lapins. Selon ce qu'elle trouve, elle se nourrit également d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens. Elle est plutôt nocturne, mais il est possible d'entendre son chant en plein jour.

Reproduction

Elle recherche les cavités naturelles dans les arbres ou encore un ancien nid de buses, de corneilles ou d'écureuils. La femelle couve ses œufs durant 4 semaines. Les jeunes prennent leur premier envol vers l'âge de 7 semaines, mais ils restent dépendants de leurs parents parfois 4 mois après l'envol.

RÉPARTITION

Au Québec, elle est une espèce résidente : elle n'effectue pas de migration. Tant qu'elle trouve assez de proies pour se nourrir, elle n'a pas tendance à se déplacer sur de longues distances. La plupart des chouettes rayées vont occuper le même territoire toute l'année, voire toute leur vie! Elle habite les forêts matures mixtes ou feuillues intactes et non fragmentées. Elle réside aussi dans l'est des États-Unis et le long de la côte de la Colombie-Britannique.

STATUT ET POPULATION

L'espèce est classée en sécurité¹. Sa population a beaucoup souffert des coupes forestières intensives qui ont détruit son habitat. Elle est très sensible aux activités humaines, mais n'hésite pas à utiliser les nichoirs construits par l'homme. Dans les érablières, elle aide les acériculteurs à contrôler les rongeurs qui attaquent la tubulure.

¹Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015

