





# Hibou des marais

Short-eared Owl, *Asio flammeus*



## IDENTIFICATION

Il se caractérise par ses toutes petites aigrettes à peine visibles. Son plumage comporte des teintes de blanc crème et de chamois, avec des rayures qui parsèment son plumage. Son disque facial est bordé de blanc. Les cercles noirs autour de ses yeux jaunes ressemblent à des lunettes. Le dessous de ses ailes est pâle et marqué d'une tâche foncée au poignet.



34-42 cm

## ÉCOLOGIE

### Alimentation

Il se nourrit principalement de campagnols, mais aussi d'autres rongeurs et occasionnellement d'oiseaux. Curieusement, ce hibou chasse surtout durant la journée. On le reconnaît dans les champs à son vol bas et irrégulier qui ressemble à celui d'un papillon. Ce vol particulier l'aide à repérer sa proie.

### Reproduction

Le nid est une simple dépression creusée directement sur le sol en milieu ouvert, comme un champ ou un marais. Les jeunes effectuent leur premier envol à l'âge de 4 semaines et dépendent de leurs parents encore quelques semaines.

## RÉPARTITION


Son aire de répartition est l'une des plus étendue au monde chez les hiboux. Il niche dans les milieux ouverts et/ou humides et peut même nicher dans la toundra. En l'absence de milieux humides (marais, marécages, tourbières), il utilise les prairies herbeuses et les champs agricoles.

## STATUT ET POPULATION

Le nombre de mentions a chuté de plus de la moitié en 25 ans<sup>1</sup>. Le nombre d'individus admis en réhabilitation à l'UQROP a aussi tendance à diminuer au fil des ans. Heureusement, plusieurs mesures sont instaurées pour protéger cette espèce : la conservation et la restauration de son habitat et la sensibilisation auprès des producteurs agricoles afin d'adapter leurs pratiques. L'espèce est considérée en sécurité.

<sup>1</sup> Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (2019)

<sup>2</sup> Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015



■ Nidification  
■ Hivernage  
■ À l'année